

Hvad går operationen ud på?

Pupillen udvides med øjendråber, og øjet bedøves. Der laves et lille snit, og linsen fjernes med ultralyd. En ny linse af kunststof lægges ind på den gamle lenses plads i linsekapslen. Den kunstige linse holder oftest resten af livet.

Risiko og komplikationer

Som ved enhver operation er der en vis risiko for komplikationer. Hos 1-2 % forekommer der bristning af linsekapslen. Dette kan oftest håndteres uden blivende mén. Blindhed på det opererede øje optræder ved ca. 1 ud af 1000 operationer og skyldes som regel alvorlig blødning i øjet under operationen, eller betændelse inde i øjet efter operationen.

Efterstær

Hos ca. 25 % vil der i løbet af nogle år udvikle sig efterstær, som er en uklarhed i linsekapslen. Det opleves som sløring af synet, nogenlunde som da man havde grå stær. Efterstær kan fjernes ved en beskeden, ambulans laserbehandling.

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den efterfølgende mundtlige information.

Undertegnede har læst og forstået denne skriftlige information samt den efterfølgende mundtlige information. Jeg giver mit informerede samtykke til operation for grå stær.

Dato:.....
Navn :.....
CPR.nummer.....



Dytmærskens 12, 1.
8900 Randers
Tlf. 21864842

Grå stær operation

1. øje

Operation _____ dag d. _____ kl. _____

Kontrol _____ dag d. _____ kl. _____

2. øje

Operation _____ dag d. _____ kl. _____

Kontrol _____ dag d. _____ kl. _____

Navn: _____

Cpr: _____

**ALLE PAPIRER BEDES UDFYLDT OG
MEDBRAGT PÅ OPERATIONS DAGEN.**

Inden operationen

skal du have købt de ordinerede øjendråber på apoteket. Dråberne skal opbevares i køleskabet og skal først anvendes efter operationen.

På operationsdagen

må du ikke køre bil.

Spis som du plejer. Tag din sædvanlige medicin bortset fra vanddrivende tabletter.

Undlad makeup på operationsdagen samt indtil 1 uge efter operationen.

Før operationen vil øjet blive dryppet med pupiludvidende og bedøvende øjendråber flere gange.

Medbring evt. solbriller, da øjnene kan være lysfølsomme efter operationen.

Smerter det første døgn efter operationen

Du kan forvente grus fornemmelse og sløret syn det første døgn efter operationen. Ved smerter kan du evt. tage 2 stk.

Panodil, eller lign. Hvis der efter 1 time stadig er stærke smerter, bedes du kontakte øjenklinikken eller lægevagten.

De følgende dage

Lev som du plejer. Undlad at trykke eller gnide i øjet.

Hvis du har hårdt fysisk arbejde eller særligt fysisk belastende fritidsinteresse, må du spørge øjenlægen til råds.

Hvis der kommer tiltagende smerter, rødme eller aftagende syn, bør du kontakte øjenklinikken tlf 21864842 eller vagtlægen tlf 70113131.

Du vil få tid til kontrol 1 uge efter operationen på øjenklinikken.

Øjendrypning

Start altid med at vaske hænder først!

Vi anbefaler øjendrypning i liggende stilling.

Med en finger trækker du nederste øjenlåg nedad, mens du med den anden hånd drypper en dråbe ned i folden mellem øjet og øjenlåget. Undgå at berøre dråbeflaskens spids, da dråberne så forurenes. Dryp med de ordinerede øjendråber 3 gange om dagen, indtil de to flasker er tomme. Hvis du er i behandling med øjendråber fra tidligere, fortsætter du uændret med disse.

Briller

Mange har glæde af solbriller den første tid. Du må gerne bruge dine gamle briller, men måske ser du bedre uden. Øjet tager ikke skade af, at der anvendes briller med forkert styrke.

En del opnår først tilfredsstillende syn på afstand, når der laves nyt brilleglas. Næsten alle vil få brug for læsebriller. Da brillebehovet ændrer sig en del den første tid efter operationen, bør der gå 6 uger efter den sidste operation, før nye briller laves.

Mange har i overgangsperioden glæde af en billig læsebrille, der kan købes i de fleste supermarkeder.

Svømmehal

Ingen svømmehal i 14 dage.

Hvad er grå stær?

Grå stær er uklarheder i øjets linse. Linsen ligger inde i øjet bag pupillen og regnbuehinden. Når linsen bliver uklar, kan lyset ikke komme ind i øjet, og synet bliver ringere.