

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den med ro. Tag en ren klud og tryk mod det sted der bløder, i mindst 10 minutter. Dette vil oftest standse blødningen. Hvis det fortsat bløder, må du tage kontakt til Randers Øjenklinik på tlf. 86437311. Du kan også møde op i klinikken. Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes vagtlægen på tlf. 70113131.

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den efterfølgende mundtlige information.

Undertegnede har læst og forstået den skriftlige og efterfølgende mundtlige information om operation for hængende øjenbryn. Jeg giver hermed mit informerede samtykke til operation for hængende øjenbryn.

Cpr.nr: _____

Dato: _____

Navn: _____



Dytmærskens 12, 1.
8900 Randers
Tlf. 86437311

Operation for hængende øjebryn

Hængende øjenbryn

kan være et led i den normale aldringsproces.

Hos nogle er tilstanden opstået efter en ansigtslammelse eller efter en skade mod øjenbrynet.

Hvis det hængende øjenbryn giver gener, kan det være nødvendigt med en operation hvor man syer øjenbrynet op på plads. Operationsresultatet er oftest livsvarigt. Hos enkelte må operationen dog gentages.

Før operationen

skal du spise samt tage din medicin som vanlig. Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales det med øjenlægen og evt egen læge om der skal holdes en pause med den.

Du skal ikke bruge øjen make up indtil 1 uge efter operationen.

Operationen

foregår ambulant og i lokalbedøvelse.

Ved operationen løftes øjenbrynet op. Dette gøres ved, at der lægges et snit ved den øverste kant af øjenbrynet. Når operationen er overstået, får du nogle små hvide hudplastre på øjenbrynet. Disse hudplastre skal blive siddende, indtil du

kommer og får fjernet stingene.

Der vil således altid komme et ar svarende til den øverste kant af øjenbrynet.

Operationen varer ca. 45 min. Efter operationen hviler du 10 minutter i venteværelset, derefter kan du tage hjem.

Det er tilladt at køre bil hjem.

Efter operationen

må du må gerne tage brusebad. Bad i svømmebassin frarådes.

7-10 dage efter operationen kommer du til efterkontrol, hvor plastre og tråde fjernes.

Der vil de første dage være en strammende fornemmelse i såret.

Efter operationen vil der være et stregformet ar svarende til øvre del af øjenbrynet.

Risiko for komplikationer

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne type operation er sjældne. Det kan f.eks. være blødning eller infektion. Enkelte gange vil øjenbrynet ikke komme til at sidde i helt den samme højde som det modsatte øjenbryn.

Årsagen kan være, at helingsprocessen ikke altid kan forudsiges eksakt.