

være, at helingsprocessen ikke eksakt kan forudsiges.

Infektion kan antibiotikabehandles.

Stramhedsfornemmelsen aftager i løbet af den første uge.

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den med ro. Tag en ren klud og tryk mod det sted der bløder, i mindst 10 minutter. Dette vil oftest standse blødningen. Hvis det fortsat bløder, må du tage kontakt til Randers Øjenklinik på tlf. 86437311. Du kan også møde op i klinikken. Udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen på tlf. 70113131

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den efterfølgende mundtlige information.

Undertegnede har læst og forstået den skriftlige og den efterfølgende mundtlige information om operation for hængende øjenlåg.

Jeg giver hermed mit informerede samtykke til operation.

Cpr. nummer.....

Navn.....

Dato.....



Dytmærskens 12, 1.
8900 Randers
Tlf. 86437311

Operation for hængende øjenlåg

Hængende øjenlåg

er oftest forårsaget af en svækkelse af den muskel, som hæver og sænker øjenlåget. Tilstanden kan være et led i den normale aldringsproces, men den kan også være medfødt. En skade på øjenlåget kan bevirke, at øjenlåget kan komme til at hænge.

Hvis det hængende øjenlåg giver gener, kan det være nødvendigt med en operation, hvor øjenlåget hæves. Det er sjældent, at øjenlåget daler igen således, at man skal opereres igen.

På operationsdagen

må du ikke bruge øjenmakeup samt indtil en uge efter operationen.

Du skal tage din medicin som du plejer.

Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales med øjenlægen samt evt egen læge om der skal holdes en pause.

Når operationen er overstået, får du nogle små hvide hudplastre på øjenlåget. Disse hudplastre skal blive siddende indtil du kommer og får fjernet stingene.

Operationen

foregår ambulat og i lokalbedøvelse.

Ved operationen strammer man hæve-sænke musklen op. Operationen varer ca. 45 minutter. Efter operationen hviler du 15 minutter i

venteværelset, og herefter kan du tage hjem. Du må ikke selv køre bil hjem efter operationen.

Efter operationen

er det godt at bruge kølige omslag for at modvirke hævelse. Et rent håndklæde lægges over øjenlågene, og herpå lægges fx en plastikpose med frosne ærter. Omslaget bliver liggende i 10 minutter. Hvis det føles ubehageligt koldt, fjernes omslaget.

Behandlingen gentages 5 gange dagligt de første 2 dage efter operationen.

Du må gerne tage brusebad efter operationen.

Bad i svømmehal og i havet frarådes.

5-7 dage efter operationen kommer du til efterkontrol. Ved kontrollen fjernes de hvide hudplastre og trådene.

Der vil være et lille stregformet ar i øjenlågsfolden.

Risiko for komplikationer

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne type af operation er sjældne. Det kan f.eks. være blødning, infektion, stramhed og asymmetri. Lejlighedsvis vil øjenlåget ikke komme til at ligge i eksakt samme højde som det modsatte. En årsag til dette kan