

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den med ro. Tag en ren klud og tryk den let mod det sted der bløder i mindst 10 minutter. Dette vil oftest standse blødningen.

Hvis det fortsat bløder, må du kontakte øjenlæge Marianne Berthelsen på tlf. 86 43 73 11. Du kan også møde op i klinikken. Udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen på tlf. 70113131.

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den efterfølgende mundtlige information.

Undertegnede erklærer hermed at have læst og forstået ovenstående informationsmateriale samt den efterfølgende mundtlige information. Jeg giver mit informerede samtykke til operation for tunge øjenlåg.

Cpr: _____

Dato: _____

Navn: _____



Dytmærskens 12, 1.
8900 Randers
Tlf. 86437311

Operation for løs hud på øvre øjenlåg

Løs øjenlågshud

kan være forårsaget af et hudoverskud på øjenlågene. Dette opstår ofte som følge af den normale aldringsproces. Lejlighedsvis kan hudoverskuddet give gener, som gør det nødvendigt at operere. Operationsresultatet varer ca. 10 år, enkelte patienter bliver opereret flere gange. Man kan ikke forvente fuldstændig symmetri mellem de to øjenlåg efter operationen. De fleste har en smule asymmetriske ansigtstræk fra fødslen. Efter operationen vil der være et stregformet ar der er beliggende i øjenlågssfolden.

Før operationen

kan du spise og drikke som du plejer. Du skal ikke bruge øjenmake-up. Du skal tage din vanlige medicin. Bruger du blodfortyndende medicin, skal du aftale med øjenlægen og evt. egen læge om der skal holdes pause i forbindelse med operationen.

Operationen

foregår ambulat og i lokalbedøvelse. Ved operationen fjerner man den del af hudoverskuddet, der generer. Når operationen er overstået, får du nogle hvide hudplastre på øjenlåget. Disse skal blive siddende, indtil du kommer til fjernelse af stingene.

Operationen varer ca. 20 minutter per øjenlåg. Efter operationen hviler du mindst 10 minutter i venteværelset.

Du må selv køre bil hjem efter operationen

Efter operationen

er det en fordel at bruge kølige omslag for at modvirke hævelse. Et rent håndklæde lægges over øjenlågene, og herpå en plasticpose med fx frosne ærter. Omslaget bliver liggende i 10 minutter. Hvis det føles ubehageligt, fjernes det. Behandlingen gentages 5 gange dagligt de første 2 dage efter operationen.

Du må gerne tage brusebad dagen efter operationen. Bad i svømmehal, brug af makeup, brug af kontaktlinse og kraftig motion frarådes indtil stingene er fjernet.

Efter operationen kan der være en strammende fornemmelse i såret men ikke stærke smerter. 4-7 dage efter operationen kommer du til efterkontrol. Ved kontrollen fjernes de hvide plastre og trådene.

Risiko for komplikationer

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne operation er sjældne. Det kan f.eks. være blødning, infektion, stramhed eller asymmetri. Stramhed fortager sig i løbet af de første 6 måneder. Infektion kan antibiotika behandles.